



Ganglionlar

Ganglion kistleri, **el** ve **bileğinde** oluşan ve bazen **büyüme** gösteren **kitle**lerdir. Bu **kistler** çoğunlukla

el
bileği
nin üst tarafında görülür. Daha az sıklıkla

el bileği
nin

avuç içi
tarafında,

parmak
ların uç

eklem
lerinin üzerinde de ortaya çıkar. Bu

kist
ler özellikle yeni oluşmaya başladığı dönemlerde veya elin sürekli zorlandığı aktivitelerde **ağrı**

lı olabilir. Büyüklükleri zamanla değişebilir ve bazen kendiliğinden kaybolabilirler. Bu **kist**

ler iyi huylu

tümör

yapısındadır.

Tanı

Kistin bulunduğu yer ve görünümü temel alınarak ganglion tanısı konur. Olası **eklem problemi** erini araştırmak için radyolojik inceleme yapılabilir. Yine şişliğin yapısını inceleyebilmek amaçlı ultrasonografik görüntüleme yönteminden de faydalanabilir.

Tedavi

Hiçbir yakınmaya sebep olmayan **ganglion kistleri tedavi** gerektirmez, sadece izlemek yeterlidir. Ancak, **kist ağrılı** ve günlük aktiviteleri sınırlıyorsa veya

estetik

olarak görünümü kötü ise

tedavi

edilmesi gerekir.

Kist

içindeki sıvının bir enjektör ile boşaltılması ve/veya el bileğinin bir atel yardımı ile tespit edilmesi,

cerrahi

olmayan

tedavi

yöntemlerini oluşturur. Bu yöntemlerden sonra

kist

in ve yakınmaların tekrarlama olasılığı yüksektir. Cerrahi olmayan

tedavi

uygulamalar başarısız olursa,

kist

in cerrahi olarak çıkarılması bir

el cerrahisi

uzman tarafından önerilebilir.



Cerrahinin amacı, **kisti** kaynağı ile birlikte çıkartmaktır. Bu yüzden cerrahi işlem sırasında **ganglion**

ile birlikte eklem kapsülünün veya tendon kılıfının bir kısmının çıkarılması gerekebilir. Eğer

ganglion

el bileği

nden çıkartıldıysa,

ameliyat

tan sonra

el bileği

ni tespit eden bir atel uygulanması, bazı hastalarda görülen ameliyat bölgesinde duyarlılık ve

ŐiŐme

gibi bulguların oluŐmasını önleyebilir.

Ganglionların cerrahi olarak ıkartılması en başarılı tedavi yöntemidir ve bu kistlerin tekrarlama olasılığı ok azdır.

Ganglion Kisti Nedir ?

Aniden el bileđinizin üzerinde bir ŐiŐlik fark etmeniz ok hoŐ olmayan bir Őurpriz olabilir. Ancak telaŐlanmayın bunların bir ođu zararsız ganglion kistleridir ve zaman ierisinde kendiliđinden kaybolacaklardır.

Sık olarak ganglion kistleri el bileđinin sırt blmnde oluŐur (dorsal **ganglionlar**). Ancak bazen el bileđinin arka blmnde nabız alınan blge ile baŐparmađınızın arasında da ortaya ıkabilirler. Bazense parmakların eklemleŐtiđi alanlarda yada parmakların dip noktalarında grlebilirler. Ganglion eklem ierisinde yer alan kemik ve kas dokularının arasında bulunan bađ dokusundan kaynaklanarak ŐiŐlik grnts ile karŐımıza ıkar. Bu ŐiŐliđin ierisinde yođun, kaygan eklem sıvısı ile aynı zellikte bir materyal bulunur. Genel bir kural olarak hareketliliđinizin artması ile bu ŐiŐlik byr ve tam tersi hareketliliđinizin azaldıđı dnemlerde bu ŐiŐlik klr.

Ganglion kisti nasıl oluŐur?

Ganglionların oluŐum mekanizmasını baŐlatan sebepler bugn iin halen bilinmemektedir. Kadınlar da erkeklerden daha sık olarak grlr ve en sık olarak el bileđinin zerine srekli yk uygulamak zorunda kalan jimnastikilerde grlr. Ganglion iindeki kistik yapı eklemde geen sinir dokuların zerine bası yapacak kadar bydđ zaman ađrı oluŐturabilirler. ok byk **ganglionlar** ađrısız olsalar da rahatsız edici olabilirler. Tam tersi cilt altı ok zor ortaya konabilen kk **ganglionlar** ok ađrılı olabilirler.

Muayene ve tanı

Doktorunuz size bu ŐiŐliđin ne zamandan bu yana var olduđunu, ebadında bir deđiŐiklik olup olmadıđını, ađrılı olup olmadıđını soracaktır. Yine muayene esnasında parmađı ile kistin zerine bastırarak basın uygulayacak ve bir ıŐık kaynađı ile kistin ıŐık altında ki grntsn inceleyecektir. ektireceđiniz bir grafi ve tetkikler ile bu olayın romatizmal hastalıđa bađlı eklem bozukluđundan yada bir kemik tmrnden kaynaklanıp kaynaklanmadıđı araŐtırılacaktır.

Tedavi

Tedavinin birinci aşamasını konservatif yöntemler oluşturur.

Takip: Ganglion tümöral bir yapı olmadığı için ve zaman içerisinde kendiliğinden kaybolabileceği için doktorunuz kontrolü altında belli bir süre beklenebilir.

Tespit: Aktivite ile ganglion boyu artacağı için, bunun sonrasında sinir basısına bağlı ağrı gelişebileceği için doktorunuz size bir el bilekliği veya alçı tespiti ile takip önerebilir. Bu esnada ganglion küçülebilir belki de kaybolabilir. Ağrı azaldığında veya ganglion küçüldüğünde el bileği hareket açıklığını arttırmaya yönelik bir tedavi başlanır.

Aspirasyon: Ganglionun ağrıya yol açtığı durumlarda veya hareket kısıtlılığı yaratacak kadar büyüdüğünde, ganglion içindeki sıvı “aspirasyon” adı verilen bir işlem ile dışarı çekilebilir. Ancak bu işlem esnasında sıvının çok yoğun olması sebebiyle sıvı dışarı alınamayabilir.

Yukarıda anlatılan tedavi yöntemleri sonrasında ganglionun verdiği hareket kısıtlılığı ve ağrı giderilemediği zaman ganglionun çıkarılması gerekir. Ancak unutulmaması gereken nokta bu işlemin ardından ganglionun tekrarlayabileceğidir. Bu işlem sonrasında birkaç gün için ağrı, şişlik gibi problemler ile karşı karşıya kalınabilir.